

Ueber
Scharlach.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doctorwürde
aus der
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe
unter dem Präsidium
des Herrn Professors Dr. Franz Seitz
der medicinischen Facultät
der Ludwig - Maximilians - Universität
zu München
vorgelegt von
Georg Hammermayer,
prakt. Arzt in Reichertshofen.

München, 1881.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Ueber
Scharlach.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doctorwürde
aus der
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe
unter dem Präsidium
des Herrn Professors Dr. Franz Seitz
der medicinischen Facultät
der Ludwig-Maximilians-Universität
zu München
vorgelegt von

Georg Hammermayer,

prakt. Arzt in Reichertshofen.

München, 1881.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Unter den akuten exanthematischen Infections-Krankheiten, Blattern, Scharlach, Mafern, Varicellen, welche in den pathologischen Schriften wegen einer Reihe von Eigenthümlichkeiten gewöhnlich und mit Recht zu einer Gruppe zusammengeworfen werden, spielt der Scharlach eine hervorragende Rolle. Geschichtlich ist der Scharlach das jüngste Glied dieser Gruppe; denn während die Blattern nach Moore (History of small-pox 1815) den Indern und Chinesen schon 1—2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung bekannt gewesen sind, in Europa aber erst Ende des 6. Jahrhunderts epidemisch wütheten, die Mafern bereits in der Schrift des Rhazes (850—932) „de variolis et morbillis“, und die Varicellen im 15. Jahrhundert erwähnt werden, haben wir von dem Auftreten des Scharlach erst im Anfange des 17. Jahrhunderts sichere Nachricht durch Mercatus, welcher 1610 in Spanien und durch Sgambatus, welcher 1618 in Italien Scharlachepidemien beobachtete. Bald nach diesen finden wir eine Beschreibung des Scharlach von Döring, welcher diese Krankheit in Breslau 1625 sporadisch und 1627 epidemisch zu beobachten Gelegenheit hatte. Von dieser Zeit an verbreitete sich der Scharlach rasch über ganz Europa, so dafs mit Anfang des 18. Jahrhunderts kein Land von ihm verschont geblieben ist. Nur auf den Faröern ist er nach Panum noch niemals erschienen.

Ogleich die jüngste unter den Infectionskrankheiten ist er dennoch die gefährlichste und darum gefürchtetste Krankheit; wenn auch die Blatternepidemien relativ mehr Todesfälle verursachen, so steht die Summe dieser Todesfälle doch in keinem

Verhältnifs zur Zahl der Opfer, welche der Scharlach alljährlich erfordert; Blatternepidemien sind seit Einführung der Kuhpockenimpfung weitaus feltener und nicht so umfangreich als Scharlachepidemien; überdies ist der Scharlach in großen Städten und vielfach auf dem Lande nie vollkommen erloschen; die zeitweiligen Epidemien werden fortwährend durch sporadische Fälle verknüpft. Von verschiedenen Seiten ist auch bemerkt worden, daß die Dauer und Häufigkeit der Epidemien zugenommen und jetzt fast jeder Mensch den Scharlach zu bestehen hat.

Die Eigenthümlichkeiten, welche diese Gruppe von Infectionskrankheiten gemeinsam hat, sind: Ansteckungsfähigkeit, Uebertragbarkeit, ein meist epidemisches Auftreten, ein bestimmter Verlaufs-Typus, Inkubation, mehr oder weniger hohes Fieber, ein für jede Form eigener Ausschlag. Mit dem einmaligen Ueberstehen dieser Krankheiten ist die Disposition zu ihnen gewöhnlich zeitlebens getilgt; es ist daher anzunehmen, daß im Verlaufe dieser Krankheiten im Körper des betroffenen Individuums in der ganzen Säftemasse sowohl als auch in den festen Geweben mehr oder weniger bedeutende bleibende Veränderungen herbeigeführt werden.

Zweimalige Erkrankungen an Scharlach sind selten und kommen vor 1) als wahres Recidiv während der im Gange befindlichen oder eben abgemachten Desquamation in der vierten oder fünften Woche vom Beginn der Erkrankung; oder 2) als wirkliche zweite Erkrankung, welche 1,2—6 Jahre von der ersten getrennt war und bald milder, bald tödtlich verlaufen kann. — Scharlachepidemien herrschen vorzugsweise im Herbst und im Frühjahr; sie folgen sich bald in kurzen bald in langen Zwischenräumen, haben eine sehr verschiedene Dauer und treten bald gutartig bald böartig auf, ein Umstand, welcher bis jetzt noch ganz unaufgeklärt ist.

Der Scharlach ist eine contagiöse Krankheit, darin stimmen fast alle Forscher überein, obwohl auch nicht zu leugnen ist, daß er unter uns noch unbekannten Verhältnissen auch spontan ent-

flehen könne. Die Natur des Scharlachcontagiums ist noch nicht mit Sicherheit erkannt; Coze, Feltz und Ries sahen im Blute Scharlachkranker punkt- und flächchenförmige, lebhaft sich bewegende Gebilde; diese und verschiedene andere neuere Beobachter sind geneigt, die Uebertragbarkeit der Krankheit mit diesen punkt- und flächchenförmigen Gebilden (Mikrokokken), welche der ausgeathmeten Luft und den Secreten inhäriren, in Beziehung zu bringen. Fothergill war der erste (1750), welcher die Contagiosität der Krankheit lehrte, sowie dafs die Infection regelmäßig durch die Einathmung des Giftes stattfindet. Subcutane Impfungen mit dem Blute Scharlachkranker, welche an Kaninchen vorgenommen wurden, bewirkten meist raschen Tod der Thiere und zwar unter Bildung der nämlichen Gebilde in ihrem Blute. Weiterimpfungen des Kaninchenblutes hatten den gleichen Erfolg; ein Ausschlag jedoch kam an den Thieren nicht zum Vorschein. Die bisherigen Versuche, dem Menschen den Scharlach zu inokuliren, mißglückten oder lieferten nur unbestimmte und unverwerthbare Resultate.

Die Ansteckung des Scharlach geschieht durch Aufenthalt in einer von Scharlachkranken inficirten Atmosphäre, oder dadurch, dafs das Gift durch Mittlerpersonen, die selbst von der Krankheit verschont blieben, oder durch Kleider und Wäsche an entfernte Individuen übertragen wird; es mufs also das Scharlachgift offenbar in der Haut- und Lungenausdünstung der Kranken enthalten sein. Dem Scharlachgift ist eine besonders starke, Wochen, Monate und Jahre überdauernde Tenacität, an Gegenständen fortzuleben, zugeschrieben worden. Diese Lehre ist besonders in England stark verbreitet und soll der Scharlach dortselbst sogar durch Milch in die Kundschaft einzelner Milchhändler eingeschleppt worden sein, deren Kinder an Scharlach erkrankt waren. Das Contagium mufs ohne Zweifel in die Blutmasse eindringen, entweder durch die Respirationswege, oder durch den Magen, kurz auf den Wegen, auf welchen überhaupt äufsere Substanzen in den Organismus gelangen können.

Während der Inkubationszeit entwickelt der scharlachkranke Körper noch kein Contagium, weil er nur lokal angesteckt, nicht in seiner ganzen Blutmasse durchseucht ist und den Giftstoff noch nicht reproducirt hat. Die Inkubationszeit dauert beim Scharlach gewöhnlich 4—7 Tage, doch haben einige Beobachter ausnahmsweise eine solche von nur 24—48 stündiger Dauer, wieder andere selbst bis zu 13 tägiger Dauer anzunehmen Veranlassung gehabt. Während dieser Zeit klagen einzelne Kranke über Mattigkeit, Abgeschlagenheit, Unlust zur Arbeit, die meisten Kranken jedoch fühlen sich ganz wohl, bis endlich das Stadium prodromorum auch diesen ihren krankhaften Zustand erkennen läßt.

Die Erscheinungen, welche das Contagium im Organismus erzeugt, sind ziemlich prägnant; zuerst zeigt sich Fieber, welches rasch mit oder ohne Schüttelfrost sich einstellt und schon gleich Anfangs bis zu 40° C. steigt; die Haut ist brennend heiß, die Pulsfrequenz bis zu 160 Schlägen; sehr bald stellen sich Halschmerzen ein und bei näherer Befichtigung des Halses ist bereits das Exanthem auf der Schleimhaut des Rachens und der Mundhöhle lokalisiert. Die Patienten klagen über Kopfschmerz, Brechreiz, allgemeine Schmerzhaftigkeit der Glieder; häufig kommt es auch zu wirklichem Erbrechen von Speisen und Schleim. Dieser Zustand dauert 1 bis 2 Tage, nach welchen sich dann das Hautexanthem (Stadium eruptionis) ausbildet; dieses entwickelt sich zuerst am Halse und an den angrenzenden Theilen des Gesichtes, der Brust, der Schulter und des Rückens; am nächsten Tage ist der ganze Kopf, der Stamm und die Arme bis zu den Fingerspitzen vom Auschlage überzogen; am 4. Tage sind auch schon die Genitalien und die Füße geröthet, so daß bei einigermaßen lebhaftem Auschlage keine Hautstelle frei bleibt. Während das Exanthem sich ausbreitet, steigt die Körperwärme, nur mit kleinen Morgenremissionen unterbrochen, allmählig bis zu 41° und 42° C. Mit dem Erblaffen des Exanthems geht auch das Fieber langsam zurück.

Das Scharlachexanthem entwickelt sich manchmal so rasch,

daß man glauben möchte, es sei der ganze Körper plötzlich von ihm bedeckt worden; gewöhnlich aber ist der Gang der Entwicklung leicht zu verfolgen. Zuerst erscheinen auf der Haut zerstreute lichtrothe Fleckchen, welche wie aus der Tiefe hervorschwimmern; in den nächsten 12 Stunden erfolgt ein reichlicher Nachschub, die Fleckchen färben sich röther, und sind dicht gedrängt neben einander, nur durch weiße Hautlinien geschieden; die Haut hat das Ansehen, als wenn sie mit blafsrother Tinte bespritzt wäre. Im raschen Fortschritt der Eruption verschwimmen nun die weißen Zwischenlinien mehr und mehr und die Haut nimmt ein gleichmäßigeres, helleres oder dunkleres Colorit an. Indessen haben sich auch eine Menge Hautfollikel, falls sie nicht schon von vorneherein geschwollen waren, über ihre Umgebung erhoben, so daß der Ausschlag mit dunkleren Knötchen bald dichter bald sparsamer besetzt ist, und dadurch ein unebenes Aussehen gewinnt. Diese beiden Momente, die Entstehung des Exanthems aus getrennten Fleckchen und die Follikular-Betheiligung bilden das wichtigste Symptom in der Differentialdiagnose zwischen Scharlach, Masern und einem fieberhaften Erythem.

In seiner höchsten Blüthe bleibt das Exanthem 1 bis 3 Tage stehen und erblafst dann in derselben Reihenfolge wie es entstanden ist. Die Röthung ist offenbar durch eine stärkere Injection der Capillaren an der Oberfläche der Cutis unterhalb der Epidermis bedingt und verschwindet unter dem Fingerdrucke, so daß man dieselbe nicht von der Ablagerung eines besonderen Pigments herleiten kann. Die Röthe bedingt neben der Veränderung an der Haut auch eine seröse Infiltration des Unterhautzellgewebes, eine mäßige Hautschwellung, welche besonders an dem gedunsenen Gesichte und den angelaufenen Ohrmuscheln wahrzunehmen ist.

Je dunkler das Exanthem ist, desto längere Zeit bedarf es zu seinem völligen Verschwinden; gewöhnlich steht es 5 bis 7 Tage, reicht jedoch auch manchmal bis in die zweite Woche hinein. Mit der Ausbreitung des Exanthems wachsen auch die Hals-

schmerzen, die Schlingbeschwerden dauern fort, und bilden oft das lästigste Symptom des ganzen Krankheitsverlaufes. Die Zunge ist etwas geschwollen, breiter und dicker und ihre Papillen ragen verlängert und verdickt empor. Nach Abstoßung der grauweißen Epithellage sieht die Zunge brennend roth wie geschunden aus. Am 7. oder 8. Tage hat sich die Zunge wieder regenerirt und ihr normales Aussehen bekommen.

Die Urin- und Harnstoffausscheidung ist nach Redenbach (Jahrb. f. Kinderhkd. 1861) im Stadium prodromorum am bedeutendsten gesunken, im Stadium eruptionis und der Blüthe des Scharlach-Exanthems sehr beträchtlich gegen die Norm vermindert. Ich habe bei der später zu beschreibenden Scharlachepidemie einige Fälle beobachtet, bei denen volle 2 Tage Anurie vorhanden war.

Einen oder mehrere Tage nach dem Stadium florescentiae beginnt das Exanthem zu erblaffen, und die Haut fängt zu jucken und zu brennen an; die Epidermis fühlt sich rau und borkig an, wird rissig und stößt sich in kleineren oder grösseren Fetzen ab. Dieses Stadium Desquamationis dauert verschieden lange Zeit, je nachdem das Exanthem mehr oder weniger intensiv geröthet war; gewöhnlich ist die Abschuppung nach 14 Tagen beendet, nach Umständen aber kann sie sich bis zu 6 und 8 Wochen hinaus verlängern, besonders dann, wenn die Abschuppung sich an denselben Körperstellen öfter wiederholt. Redenbacher hat auch auf dieses Stadium seine Harnuntersuchungen ausgedehnt und gefunden, daß in den ersten Tagen der Abschuppung Harn und Harnstoff in der Mehrzahl der Fälle sehr rasch in grösserer, die Norm überschreitender Menge ausgeschieden werden, bald aber wieder kleinere Zahlen zeigen. — Wie die Infection mit Scharlachgift auf der Haut einen höheren oder niederen Grad der Röthe zeigt, so ist auch die Entzündung der Rachen Schleimhaut eine verschieden heftige und unabhängig von dem Grade des Exanthems. Es kann die Entzündung nur als eine erythematöse Röthung der Mandeln, der Gaumenbögen und des Zäpfchens

sich zeigen, aber auch eine ausgebreitete dunkle Röthung und Schwellung der ganzen Schleimhaut des Mundes und des Schlundes eintreten; oder es kann der entzündliche Prozeß den Ausgang in Diphtherie nehmen und die Diphtherie durch die Choanen hindurch sogar in die Nasenhöhle sich fortpflanzen. In manchen Fällen verläuft die scarlatinöse Rachenentzündung als eine parenchymatöse Angina, welche zu beträchtlicher Schwellung und später zur Vereiterung der Tonsillen führt.

Ebenso konstant wie die Haut und die Rachenschleimhaut werden auch die Nieren beim Scharlach infectirt. Die Niere, sagt Buhl, bekundet überhaupt eine große Empfindlichkeit für die Vorgänge im Körper; denn jede nur einigermaßen heftige akute fieberhafte Krankheit afficirt die Nieren in größerem oder geringerem Grade, und diese Affection ist um so intensiver, je heftiger, je akuter die Krankheit auftritt.

Die Betheiligung der Nieren beim Scharlach hat von jeher die meiste Aufmerksamkeit der Aerzte auf sich gezogen, und namentlich sind die Fragen Wie? und Wann? die Nierenaffection zu Stande kommt, von verschiedenen Forschern verschieden beantwortet worden. Es mag hier der Platz sein, die Resultate einiger Beobachter anzuführen.

Eisenfchütz sagt: (Jahrb. f. Kindhlkd. 1866. VIII. 2.) „Der Catarrh der Harnkanälchen ist ein nie fehlendes, also zum Begriff des Scharlachfiebers gehörendes Symptom und der Ausgangspunkt für alle weiteren schweren Nierenerkrankungen, wie sie im Verlauf des Scharlach vorkommen.“

Steiner und Andere nehmen an, die Hyperämie der Nieren sei ein ständiger Begleiter der Krankheit, sei also keine Nachkrankheit, sondern die höhere Entwicklung eines gesetzmäßigen in der Scarlatina mitbegriffenen Vorganges. Thomas, Barthels und Bohn glauben auf Grund von Harnuntersuchungen beweisen zu können, daß die parenchymatöse Nephritis erst nach Ablauf des Scharlachs auftritt; der Harn enthält nämlich in der ersten Krankheitswoche während der Eruption und

Blüthe des Exanthems und häufig während des ganzen Verlaufes der meisten Scharlacherkrankungen keinerlei abnorme Bestandtheile, weder die mikroskopischen Spuren eines Catarrhs der Harnkanälchen (Epithelien und deren Trümmer), noch die chemischen des Albumins.

Die Nephritis tritt frühestens in der zweiten Hälfte der zweiten, spätestens in der vierten oder im Anfang der fünften, meistens in der dritten Woche nach Beginn der Krankheit, beziehentlich der Eruption des Exanthems auf, in leichten Fällen nach einer längeren, in schweren nach einer kürzeren afebrilen Periode oder auch in unmittelbarem Anschluß an das Fieber des ersten Krankheitsstadiums.

Thomas (Gerhardt Handb. der Kindkrht. IV. 3.) sagt: „Man muß sich hüten, die im Anfang zur Zeit des intensivsten Fiebers etwa vorhandene febrile Albuminurie mit derjenigen zu verwechseln, welche durch den spezifischen Einfluß des Scharlach-Giftes 2 Wochen später entsteht. Erstere hört in der Regel mit dem Nachlaß des Fiebers rasch auf und es kann sich in diesem Falle eine von Krankheitsymptomen ganz oder fast ganz freie Epoche von einer Woche Dauer und darüber zwischen das Ende der febrilen und dem Beginn der neuen spezifischen Albuminurie einschieben; in schweren andauernd hochfebrilen Erkrankungen kann natürlich auch die erstere in die letztere direkt übergehen.“

Barthels und Andere vertreten in Ziemssen's Handbuch der spez. Pathologie und Therapie Band IX in Betreff der Nephritis scarlatinosa die Ansicht, daß im Scharlach den Nieren durch das Blut spezifische Schädlichkeiten zugeführt werden, wodurch Reizung dieser Organe und Entzündung derselben verursacht werde. Als Entzündungserreger werden Mikrokokken des Blutes gedacht, welche in den Nieren eindringen und wuchern, ähnlich wie Oertel die Entstehung der Nephritis bei Diphtherie durch Pilzembolie wahrscheinlich zu machen gesucht hat. Dieser geniale Forscher fand nämlich in solchen Fällen zahlreiche Mikrokokken überall in den Nieren, sowohl in den Malpighi'schen

Knaueln als in den Harnkanälchen, und er meint, daß dieselben durch dieses Organ ausgeschieden würden, nachdem der Infektionsstoff aus der afficirten Nierenparthie vermittelt der Lymph- und Blutgefäße resorbirt worden sei; es seien daher auch die Epithelcylinder mit Haufen von Mikrokokken durchsetzt, ja nicht selten sogar streifenförmig und ihrer ganzen Länge nach mit diesen besetzt (vergl. Ziemssen's Handbuch der spez. Pathologie und Therapie. II. 1.)

Die meiste Aussicht auf Wahrscheinlichkeit in der Erklärung der Nephritis scarlatinosa dürfte jedoch die mechanische Theorie der Nierenentzündung bei Scharlach für sich haben. Diese erst in neuerer Zeit wieder zu Ansehen gekommene Erklärung der Nephritis besteht in vermehrter Blutzufuhr zu den Nieren, wozu die eigenthümlichen Verhältnisse, unter denen die Scharlachhaut steht, Veranlassung geben. Die Cutis wird, sobald die Entzündung aus ihr gewichen ist, von einer doppelten todten Lage aus Exsudat und abgestorbenem Epithel umhüllt. Bei dem Antagonismus, beziehungsweise vikariirendem Verhältnisse zwischen Haut und Nieren kann dieses Moment an sich hinreichen, mechanische Kreislaufstörungen in der Haut und demnach Hyperämie in den Nieren mit ihren Folgezuständen zu bewirken, und um so leichter, wenn die bei der Desquamation empfindlicher gewordene Haut der Erkältung unterliegt.

Wenn Nephritis scarlatinosa eintritt, so hebt sie gewöhnlich mit Fieber an oder steigert das schon vorhandene Fieber; die Harnmenge mindert sich rasch und bedeutend; der Urin ist gelbgrün bis gelbröthlich, klärt sich beim Stehen und läßt einen wolkigen Bodensatz fallen; das spezifische Gewicht ist bis zu 1020 oft vermehrt; hochgradige Albuminurie ist vorhanden. Unter dem Mikroskope finden sich nach Bohn (Gerhardt Handbuch für Kinderkt. II. pag. 277) Epithelien in wechselnder Zahl, theils normal oder bloß gequollen, theils getrübt und degenerirt; Cylinder in mannigfachen Formen und Uebergängen, Lymphkörperchen und rothe Blutzellen, daneben die Kryalle des harnsauren

Natrons, die rhombischen Tafeln und andere Gestalten der Harnsäure. — Die Nephritis scarlatinosa tritt in verschiedenen Epidemien verschieden auf; in manchen Epidemien tritt die Nephritis häufig auf, während sie manchmal andere ganz verschont. Die Nephritis steht auch in keinem Verhältniß zur Stärke des Exanthems; denn gar oft entgeht den Eltern die nur wenig ausgeprägte Hautkrankheit des Kindes und erst die nach einigen Wochen auftretende Wässerfucht gibt Veranlassung, einen abgelaufenen Scharlachprozeß zu diagnosticiren.

Bei Beginn der Scharlachepidemie in Ebenhausen, einem zu meiner ärztlichen Praxis gehörenden Pfarrdorfe, als ich noch keine Kenntniß von dem Ausbruch des Scharlach hatte, wurde ich am 27. November 1879 zur Abhaltung einer Leichenschau dorthin gerufen und fand ein 3 Jahre 8 Monat altes an der Wässerfucht verstorbenes Kind vor; auf mein Befragen, ob vielleicht eine Hauterkrankung vorausgegangen sei, wurde mir von Seite der Eltern des Kindes eine entschieden verneinende Antwort gegeben; erst nach weiterem Forſchen, ob vielleicht im Orte andere Kinder an einer Hautkrankheit erkrankt seien, brachte ich in Erfahrung, daß einige Schulkinder den Friesel hätten. Ich suchte nun diese Kinder auf und fand bei dem einen den Scharlach im Stadium der höchsten Blüthe, während das andere sich bereits im Stadium der Abschuppung befand. Es war mir nun sofort klar, daß auch dieses verstorbene Kind den Scharlach, wenn auch mit schwachem Hautexanthem, gehabt haben müßte.

6 Tage darauf (3. Dezember 1879) starb wieder ein Kind im Alter von 2 Jahren und 2 Monaten, dieses aber auf der Höhe der Krankheit; die Hyperaemie war deutlich erkennbar, die Haut durch die Infiltration dichter und derber und Spuren von Petechien in Form bläulicher Flecke deutlich sichtbar. Da inzwischen auch bereits einige Scharlacherkrankungen in meine Behandlung kamen, so war ich sicher, daß eine Scharlachepidemie in Ebenhausen ausgebrochen sei; da dies überhaupt die erste Epidemie in meiner Praxis zu werden den Anschein hatte, so interessirte ich

mich sehr dafür und notirte mir alle zu meiner Kenntniss gelangten Fälle, wenn solche auch nicht in meiner Behandlung standen.

Die Epidemie begann Anfangs November 1879 und endete Mitte Januar 1880, nach welcher Zeit keine neuen Erkrankungen mehr sich zeigten, wenn auch die Abschuppung in einigen protrahirten Fällen erst Mitte Februar beendet war. Die Epidemie dauerte also etwas über 2 Monate und war deren Verlauf ein sehr milder zu nennen; denn unter 57 konstatirten Erkrankungen waren nur 2 Sterbefälle zu bezeichnen, ein Knabe 3 Jahre und 8 Monate alt und ein Mädchen 2 Jahre 2 Monate alt; beide genossen keine ärztliche Behandlung.

Während des Verlaufes der Scharlachepidemie in Ebenhausen, einem Orte mit etwas über 500 Einwohner, konstatirte ich 57 zu meiner Kenntniss gelangte Erkrankungen; hievon waren 26 Knaben und 31 Mädchen; auf jedes Geschlecht traf ein Todesfall. Dem Alter nach theilte ich die Kranken in folgende Klassen:

Lebensjahr:	Knaben.	Mädchen.
1.	—	—
2.	—	1
3.	3	2
4.	6	7
5.	5	8
6.	—	2
7.	2	4
8.	1	—
9.	2	3
10.	3	1
11.	—	1
12.	2	—
13.	1	2
14.	1	—

Von diesen 57 Erkrankten waren 19 Kinder in ärztlicher Behandlung, die übrigen 38 Kinder ohne ärztliche Hilfe; von letzteren waren zwei Todesfälle zu verzeichnen, während von den

19 ärztlich behandelten Kindern fämmtliche gerettet wurden; in Bezug auf das Geschlecht waren unter den ärztlich Behandelten 12 Knaben und nur 7 Mädchen, obwohl im Ganzen mehr Mädchen als Knaben erkrankt waren; auch ein trauriger Beweis, dafs dem Bauer am Leben eines Knaben mehr liegt als an dem eines Mädchens.

An der Rachenentzündung theilten sich alle Erkrankten und zwar an einfacher Angina tonsillaris 41 Kinder und an Angina diphtheritica 14 Kinder; von ersteren waren 20 Knaben und 21 Mädchen, von letzteren 5 Knaben und 9 Mädchen. Bei den 2 Gestorbenen konnte die Art der Rachenentzündung nicht konstatiert werden. Von den in ärztlicher Behandlung Gestandenen litten 9 an Angina tonsillaris und 10 an Diphtheritis. Unter ersteren befanden sich 8 Knaben und 1 Mädchen, unter letzteren 4 Knaben und 6 Mädchen.

Die Nierenaffection war bei dieser Epidemie nicht besonders vorherrschend, indem unter 57 Scharlacherkrankungen nur 10 Nephritiden vorkamen. Hievon treffen 2 Fälle auf die ärztlich Behandelten, während die übrigen 8 Fälle in die Abtheilung der nicht in ärztlicher Behandlung Gestandenen fallen; von diesen endete ein Fall letal, die übrigen genafen innerhalb 1 bis 3 Wochen. Ueber die Entstehung der Nephritis gehen die Ansichten der Beobachter, wie oben erwähnt, noch immer auseinander. Thomas (Gerhardt Handbuch für Kinderkt. IV. 3) leugnet auf das Entschiedenste, dafs Nephritis schon am ersten Tage der Erkrankung vorkomme; denn die Symptome der Nephritis lassen sich gewöhnlich erst am 10. bis 14. Tage nach der Erkrankung nachweisen; allerdings gibt er in Uebereinstimmung mit Barthels zu, dafs Fälle vorkommen können, in denen eine intensive Nephritis schon bei Beginn des Exanthems erscheint, wie ja auch Fälle vorkommen, in denen Nephritis dem Exanthem und der Angina vorausgehen. Derselbe Forscher ist auch der Ueberzeugung, dafs eine Erkältung nach dem Erblaffen und Verschwinden des Exanthems die Entwicklung der Nephritis beschleunigen und sie verschlimmern kann

und nimmt an, daß eine geringe Disposition zu folcher einzig und allein durch eine Erkältung geweckt werden könne. Er berichtet von einem 12 $\frac{1}{2}$ jährigen Mädchen, welches bis zu einer heftigen Erkältung, der sie sich am 26. Tage des Scharlach aussetzte, vollkommen normalen eiweissfreien Harn entleert hatte, erst unmittelbar auf dieses Ereigniß, also zu einer ungewöhnlich späten Zeit des Scharlach, nachdem sämmtliche Lokal- und Allgemein-Affectionen längst beseitigt waren, an Nephritis erkrankte.

Auch mir stehen aus meinen Erfahrungen bei der Scharlach-epidemie in Ebenhausen einige Fälle zu Gebote, bei denen ich mit Thomas den Ausbruch der Nephritis auf eine Erkältung zurückführen muß; ein 10 jähriger Knabe nämlich, welcher nur mäßig an Scharlach erkrankt war und bereits seit 5 Tagen die Schule wieder besuchte,*) tummelte sich mit seinen Kameraden auf dem Eise herum, erkrankte am 22. Tage des Scharlach plötzlich an Fieber und klagte über Kopf- und Kreuzschmerzen; die Untersuchung des Harns, der sehr spärlich gelassen wurde, wies beträchtliche Mengen Eiweiss nach. Die Knöchel und Augenlider fingen zu schwellen an, heftiger quälender Durst trat ein, das Gesicht wurde aufgedunsen, kurz es entwickelte sich Wasserschwellung mit ihren Begleiterscheinungen, welche den bereits gesund erklärten Knaben neuerdings 11 Tage lang ans Bett fesselte. Ein anderer 9 jähriger Knabe erkrankte am 23. Tage des Scharlach an Nephritis, meiner Ueberzeugung nach nur deshalb, weil er bei hochgradiger Kälte stundenlang sich dem Vergnügen des Eisschießens hingeeben hatte. Bemerkenswerth mag auch die Beobachtung sein, daß ich bei Mädchen keine Nephritis in Folge von Erkältung nachweisen konnte, und den Grund hiefür glaube ich darin zu finden, daß die Mädchen sich weniger im Freien aufhalten, weil sie ihre Beschäftigung mehr im Hause und im Zimmer finden.

*) 14 Tage nach dem Erlöschen der Krankheits Symptome wurden die Kinder wieder in die Schule geschickt.

Damit soll jedoch keineswegs die spezifische Infection als eigentliche Ursache der scarlatinösen Nephritis bestritten werden; soviel jedoch dürfte bewiesen sein, daß der eigenthümliche, wahrscheinlich organisirte Stoff, welcher das Scharlachkontagium darstellt, und für gewöhnlich etwa 2 Wochen bis zur Erzeugung von Nierensymptomen, also wohl auch lokaler Veränderungen daselbst bedarf, sehr oft aber aus unbekannten Ursachen hierzu unfähig ist, diese Fähigkeit sofort erlangen kann, sobald ihm in Folge einer anderweitigen Veranlassung eine Circulationsstörung in den Nieren zu Hilfe kommt, welche die Widerstandsfähigkeit des Gewebes derselben gegen seine Einwirkung aufhebt oder doch wesentlich vermindert. —

Nachdem wir die Symptomatologie des normal verlaufenden Scharlachs kennen gelernt haben, wirft sich uns unwillkürlich die Frage auf, ob wir denn ganz ohnmächtig sind, dieser gefürchteten und oft so gefährlichen Kinderkrankheit mit Mitteln entgegen zu treten, welche wenigstens einigermaßen im Stande sind, die Verbreitung des Scharlachs zu verhüten?

Da der Scharlach zur Zeit der Inkubation noch nicht ansteckungsfähig ist, und man bei Beginn einer Epidemie vom schlummernden Scharlachgifte überhaupt noch keine Kenntniss haben kann, so wird die Prophylaxis erst mit Beginn des Fiebers und des Exanthems anzuwenden sein. Die Zeit der Desquamation wird besonders von den Laien gefürchtet, weil hier die morbiden Producte in grob sinnfälliger Weise von den Kranken abfallen. Zweifellos besitzen die Epidermisfetzen und Schuppen der Scharlachhaut, die mit der scarlatinösen Substanz imprägnirt sind, eine gewisse Virulenz, welche nur, wie bei den Blatternschorfen, in abgeschwächtem Grade vorhanden sein wird. Die Verstreung des Scharlachkontagiums in den Schulen ist meistens durch zu früh entlassene Reconvalescenten bedingt. Die Infectionsfähigkeit im Abschuppungsstadium verringert sich immer mehr, je tiefer die Abschuppung dringt, und die Virulenz erlischt mit dem Abgange der untersten epidermoidalen Schichten, welche während des

Scharlachprozeßes der Cutis auflagerten. Eine sich oft lange Zeit fortsetzende Abheilung bei Scharlachreconvalescenten hat nach **Bohn** (Gerhardt Handbuch für Kindkrht. II. Band) die Anfleckungsfähigkeit verloren.

Die Behandlung des Scharlach muß durch frühzeitige und oft wiederholte Bäder auf die Abkürzung der Virulenz im Stadium der Desquamation bedacht sein; denn sobald die Haut der Reconvalescenten hydropisch wird, wird die Ablofung der Epidermis verzögert oder gar sistirt. Von der Kaltwasserbehandlung rühmt man mit Recht, daß sie die Kinder ziemlich sicher auch über eine spätere Nephritis forthelfe. Von den 19 Kindern, welche in ärztlicher Behandlung standen und frühzeitig und auch noch nach erloschenem Fieber öfters gebadet wurden, erkrankten nur zwei an Nephritis, während von den 38 übrigen erkrankten Kinder, die nicht ärztlich behandelt und wahrscheinlich gar nicht oder sicher nur zu wenig gebadet wurden, acht an Nephritis scarlatinosa erkrankten. Der Arzt auf dem Lande hat überhaupt oft einen harten Kampf durchzumachen, bis sich die Eltern einmal überreden lassen, ihr Kind gerade zur Zeit der größten Fieberhitze zu baden; und viele Leute halten noch an den alten Traditionen fest, daß man jede Krankheit wegschwitzen müsse und unterstützen oft auf unfinnige Weise das Schweißstadium durch Verabreichung von oftmaligen und großen Gaben Thee.

Therapie: Bei einem gewöhnlichen unge störten Verlauf erheischt die Scarlatina keine besondere Behandlung; die Prophylaxis erfordert strenge Isolirung des Kranken und des mit ihm verkehrenden Wartpersonals. Die im Rufe eines Prophylacticums stehende Belladonna, welche zuerst von den Homöopathen (Hahnemann) und bald auch von Allopathen vielfach angepriesen wurde und selbst in unseren Tagen noch einzeln auftauchende Verehrer hat, hat sich durchaus nicht bewährt. Die früher einmal angepriesenen Einreibungen mit Speck (Schneemann) können höchstens wie andere fettige Einreibungen den Vortheil gewähren, die Haut zu entspannen und die Hitze derselben zu mindern, auf den

krankhaften Prozesses sind sie jedoch ohne Einfluss und daher auch nicht im Stande, gegen Hydrops zu schützen.

Bei dem Mangel eines sicheren Prophylacticums sind wir daher lediglich auf die Behandlung der quälenden und gefährdrohenden Symptome verwiesen. Vor Allem forge man für eine gleichmäßige nicht zu warme Temperatur (15° C.) des Krankenzimmers, schaffe eine gute aber vorsichtige Ventilation und gestatte den Kranken täglich in der Frühe sich zu waschen; ferner gebe man darauf Acht, daß das Kind nicht mit schweren Bettdecken zugedeckt werde, damit das Schwitzen möglichst ferne gehalten wird. Erst im späteren Verlaufe und in der Reconvaleszenz ist es nothwendig, die Kranken warm zu halten, da bei Verkältungen leicht Morbus Brightii eintritt. Als Getränk gebe man reines oder mit Fruchtsäften gemischtes Wasser, oder Wasser mit etwas Wein. Die Nahrung besteht in Verabreichung einer kräftigen Fleischbrühe, Milch, Milchkaffee und weißes Brod, weiche Eier, gekochtes Obst, selbst etwas Fleisch. Gegen etwa vorhandene Stuhlverstopfung gebe man Compote, einfache Klystire oder schwache Purgantia wie Ol. Ricini, Infus. Sennae etc.

Die meisten Schwierigkeiten beim Scharlach bereitet übrigens das andauernd hohe Fieber; dies zu bekämpfen oder doch auf einen mäßigen Grad zu reduciren, erfordert die meiste Aufmerksamkeit des Arztes und des Wartpersonals; denn gerade die Herabsetzung des Fiebers macht dem Kranken seinen Zustand erträglicher und ist bei schweren Epidemien oft geradezu lebensrettend.

Welche Mittel stehen dem Arzte zu Gebote, um die hohe Temperatur des Scharlachfiebers herabzusetzen? Die Beantwortung dieser Frage danken wir den Hydrotherapeuten, welche in der Behandlung der Scharlachkranken auffallend Glück hatten, so daß ihre Methode auch von Allopathen acceptirt wurde und jetzt fast überall angewendet wird.

Als wirksamstes Mittel zur Bekämpfung des Fiebers gilt ein kaltes Bad von 15° — 20° C. in der Dauer von 5—10 Minuten,

Sobald die Temperatur in der Achselhöhle über $39,5^{\circ}\text{C.}$ gestiegen ist, scheue man sich nicht, den Kranken in ein solches Bad zu bringen, und die Erfahrung hat gezeigt, dass das Bad von Kindern ebenso gut wie von Erwachsenen vertragen wird; der Erfolg ist ein außerordentlich wirkfamer, indem die Temperatur in kürzester Zeit um $2-3^{\circ}\text{C.}$ heruntersinkt und der Kranke sich nach dem Bade stets äußerst wohl befindet.

Ausnahmsweise kann bei kleinen Kindern auch ein weniger kaltes Bad schon eine ausreichende Erniedrigung der Temperatur herbeiführen, nur muß dann das Bad von längerer Dauer sein.

Eine angenehmere und mildere Form der Kaltwasser-Behandlung, wie sie in neuerer Zeit von *Ziemssen* empfohlen wurde, besteht darin, daß der Kranke in ein warmes Vollbad ($30^{\circ}-36^{\circ}\text{C.}$) gebracht wird, welches durch Zugießen von kaltem Wasser innerhalb 15—20 Minuten allmähig bis auf 20° oder 15°C. abgekühlt wird; wenn Frösteln eintritt, wird der Kranke sofort in ein warmes Bett gebracht. Diese Methode paßt namentlich für solche, bei denen bereits ein bedeutender Grad von Herzschwäche besteht, oder neben der hohen inneren Temperatur vielleicht schon eine kühle Hautoberfläche wahrzunehmen ist. Eine andere in der Kinderpraxis überall leicht durchzuführende und meistens ausreichende Kaltwasserbehandlung besteht darin, daß man ein Bettuch in kaltes Wasser taucht und damit das Kind einwickelt; dieses Verfahren wird wiederholt, so oft die Temperatur über 39°C. steigt.

Der Zweck der kalten Behandlung des Fiebers beim Scharlach besteht nach *Liebermeister* (*Gerhardt Kindkrht. II.*) in Herbeiführung möglichst vollständiger Intermissionen von einiger Dauer in den frühen Morgenstunden und in wesentlichen Remissionen in der Mittagszeit. Ist es einmal gelungen, durch consequente Antipyrese eine Herabsetzung der Temperatur bis nahe zur Norm von einiger Dauer zu erzwingen, so ist der weitere Verlauf ein relativ leichter.

Neben der Kaltwasserbehandlung kann man in schweren

Fällen auch noch Chinin reichen; Hagenbach normirt die Dosen für Kinder unter 2 Jahren auf 0,7—1,0 gr.; von 3 bis 5 Jahren auf 1,0 gr.; von 6—10 Jahren auf 1,0—1,5 gr. und von 11—15 Jahren auf 1,5—2,0 gr. Die Darreichung des Chinins ist besonders angezeigt bei hochgradiger Herzschwäche, exzessiver Pulsfrequenz, hoher innerer Hitze und kühler Haut, und hier ist der Erfolg noch ein überraschender zu nennen.

In neuerer Zeit wurde an Stelle des Chinins die Salicylsäure in doppelter Dosis empfohlen, ebenso das salicylsaure Natron, welches namentlich von Ziemssen fast ausschließlich für Chinin gegeben wird. Dieser Beobachter gibt hievon alle 2 Stunden 0,3—0,5 gr.

Ich habe das Natr. salicyl. Anfangs auch häufig verordnet, bin aber jetzt wieder davon abgekommen, weil sowohl Kinder wie Erwachsene die oftmaligen Gaben von Medicamenten scheuen; der Kostenpunkt differirt zwischen den oftmaligen Dosen dieses Mittels und den feltener nothwendigen des Chinins nur ganz wenig, Schwindel und Ohrenrauschen haben beide gemeinsam im Gefolge und der Erfolg ist bei Chinin ein entschieden größerer als bei Natr. salicyl.

Treten schwerere Erscheinungen wie Coma, Sopor, furibunde Delirien auf, so ist neben der beständigen Eisblase auf dem Kopfe auch noch die kalte Douche im Bade anzuwenden; wenn bei nachlassendem Fieber schwere Erscheinungen der Gehirnparalyse fortbestehen, läßt Liebermeister die kalte Uebergießung im warmen Vollbade vornehmen. Bei drohendem Collaps veräume man nicht, vor und nach dem Bade einige Eßlöffel voll bis zu einem Glas Wein zu reichen. Bei hochgradiger Schwäche und drohender Herzparalyse suche man die Herzhätigkeit durch starke Reizmittel wie Ammon. carbon., Campher, Moschus und vor Allem durch Wein zu beleben.

Eine besondere Beachtung und Therapie erfordert die Affection der Rachengebilde. Bei einfacher Angina genügen neben Priesnitz'schen Umschlägen adstringirende oder schleimige

Gurgelwässer mit Alaun, Kali chlor. oder Decoct. Althae. Sind die Tonsillen stark geschwollen, so erweisen sich lokale Blutentziehungen hinter den Kieferwinkeln nützlich; droht eine diphtheritische oder gangränöse Angina, so säume man nicht, energische Eisumfchläge um den Hals zu appliziren, sowie alle 2 Stunden Inhalationen von Aqua Calcis zu verordnen; innerlich hat der Gebrauch von Eisenchlorid:

Rp Ferr. chlor. 2,0

Aquae destill. 150,0

Syrup aurant. 30,0

D. S. 1 stündl. 1 Cafe- bis Eßlöffel v. z. n.

schon sehr gute Dienste geleistet und Bohn hat von dieser Methode bis jetzt noch die meisten Vortheile gesehen; nebenbei kann man noch zur Kühlung des Schlundes Eispillen geben. Dieser Methode habe ich nach meinem Dafürhalten die Rettung eines an Scharlach im höchsten Grade erkrankten Kindes zu danken, dessen Krankengeschichte hier kurz folgen soll.

Franziska Schuster, 6 $\frac{1}{2}$ Jahre alt, von schwächlicher Constitution, erkrankte nach Abrechnung der Inkubationszeit am 1. Dezember 1879 an Scharlach; am 3. Dezember war das Exanthem über den ganzen Körper in grösster Stärke verbreitet; heftiges Fieber (bis zu 41,5⁰ C.), Puls 140 und darüber, Sopor, Delirien. Die Inspection des Rachens ergab ausgebreiteten diphtheritischen Prozefs über die beiden Tonsillen, Uvula und den vordern linken Gaumenbogen; quälender Durst, der aber wegen der heftigen Schlingbeschwerden nur nothdürftig mit Eispillen gestillt werden konnte. Am 5. Tage hatte sich der diphtheritische Prozefs durch die Choanen in die beiden Nasenhöhlen ausgebreitet, so dafs das Athmen durch die Nase allein unmöglich wurde. Angesichts der hochgradigen Erkrankung, der sehr verbreiteten Diphtherie und der schwachen Constitution der Patientin stellte ich natürlich eine letale Prognose, wurde aber bereits am 7. Tage zu meiner grossen Freude eines Besseren belehrt, dafs man bei einer mild verlaufenden Epidemie die Hoffnung auf

Genefung auch in den schwersten Fällen nicht aufgeben dürfe, denn der Zustand des Mädchens besserte sich von Tag zu Tag, so daß sie nach 13 Tagen schon mit Vorbehalt einer etwa nachfolgenden Nephritis, welche jedoch nicht auftrat, als geheilt erklärt werden konnte. Die Therapie bestand in Darreichung einer Solution von Ferr. chlorat. mit Chinin, Inhalationen von Kalkwasser, Eisgürtel um den Hals, täglich 4 Bäder zu 20° C., häufige Auspritzungen der Nase mit 1% Carbol-Lösung; nebenbei wurden kräftige Fleischbrühe mit Ei, Milch und Rothwein gegeben.

Die zwei Geschwister dieses Mädchens, ein Knabe mit 4 Jahren und ein Mädchen von 2½ Jahren erkrankten bald darauf auch an Scharlach, jedoch nur in ganz mäßigem Grade; der Knabe hatte nur an der linken Tonsille und am linken vorderen Gaumenbogen diphtheritischen Beleg, während das Mädchen nur eine einfache Angina tonsillaris zu bestehen hatte.

Es erübrigt noch, mit wenig Worten die Therapie der Nephritis scarlatinosa, die ja fast immer geheilt werden kann, zu besprechen. Die Hauptaufgabe besteht hier darin, die Nieren von ihrer Blutfülle zu entlasten und die Entzündung zu heben. Man gebe vor Allem Digitalis, sowohl um den schnellen Puls, der bei Nephritis konstant und charakteristisch ist, herabzusetzen, als auch die stockende Diurese in Fluß zu bringen.

Oft kommt es vor, daß im Urin Blut in größerer oder geringerer Menge vorhanden ist; in diesem Falle ist Ergotin oder noch besser Eisenchlorid sofort zu gebrauchen; nach einigen Tagen werden die Blutspuren im Urin weniger oder sind ganz verschwunden, dergleichen die Eiweißmenge.

Bleibt die Harnmenge trotz Digitalis, Kali acet. und anderen diuretischen Mitteln gering, so gebe man, vorausgesetzt, daß das Fieber verschwunden oder doch nur sehr mäßig ist, warme Vollbäder, die man durch Zuschütten von heißem Wasser bis auf 45° C. erhitzen kann; als Getränk gebe man alkalische Sauerlinge.

Schließlich mag noch erwähnt werden, daß manchmal

während oder nach der Scharlacherkrankung außer den schon aufgeführten Rachenkrankheiten und der Brightischen Nierenerkrankung auch noch vorkommen können: Entzündung und Vereiterung der Halsdrüsen und des Halszellgewebes, Polyarthrit scarlatinosa, Endocarditis, Pericarditis, Bronchitis, Bronchopneumonie, croupöse Pneumonie, Otitis externa und media, Peritonitis.
